

- 1 Αν  $X_n \rightarrow X$ ,  $Y_n \rightarrow Y$  κατά πιθανότητα δείξτε ότι  $X_n Y_n \rightarrow XY$  κατά πιθανότητα.
- 2 Αν  $X_n \in \mathbb{R}$  ανεξάρτητες δείξτε ότι η ακολουθία  $X_n$  είναι σ.σ. φραγμένη αν και μόνο αν για κάποιο θετικό  $A$  ισχύει  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}[X_n > A] < \infty$ .
- 3 Δείξτε ότι για κάθε ακολουθία πραγματικών τυχαίων μεταβλητών  $X_n$  υπάρχει ακολουθία θετικών αριθμών  $c_n$  τ.ώ.  $\frac{X_n}{c_n} \rightarrow 0$  σχεδόν σίγουρα.
- 4 Έστω  $\delta > 0$ . Το σύνολο  $E \subseteq [0, 1]$  απαρτίζεται από εκείνα τα  $x \in [0, 1]$  για τα οποία υπάρχουν άπειρα στο πλήθος ζεύγη  $(p, q) \in \mathbb{N}^2$  τ.ώ.  $\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^{2+\delta}}$ . Δείξτε ότι το  $E$  έχει μέτρο 0.  
Υπόδειξη: Borel-Cantelli.
- 5 (α) Χρησιμοποιήστε το λήμμα Borel-Cantelli για να δείξετε την παρακάτω πρόταση (E. Stein, Harmonic Analysis, X.2.1, σελ. 442): αν  $E_j \subseteq \mathbb{R}^d$  είναι ομοιόμορφα φραγμένα μετρήσιμα σύνολα και  $\sum_j m(E_j) = \infty$  τότε υπάρχουν  $x_j \in \mathbb{R}^d$  τ.ώ. τα σύνολα  $E_j + x_j$  καλύπτουν σχεδόν κάθε σημείο του  $\mathbb{R}^d$  άπειρες φορές.  
Υπόδειξη: Δείξτε πρώτα ότι υπό τις παραπάνω υποθέσεις για τα  $E_j$  μπορείτε να βρείτε μεταφορές  $E_j + x_j$  που καλύπτουν σχεδόν κάθε σημείο του μοναδιαίου κύβου και μάλιστα άπειρες φορές.  
(β) Η υπόθεση  $\sum_j m(E_j) = \infty$  είναι προφανώς αναγκαία. Δείξτε ότι η υπόθεση τα  $E_j$  να είναι ομοιόμορφα φραγμένα είναι αναγκαία κατασκευάζοντας (για  $d = 1$ ) φραγμένα σύνολα  $E_j$  για τα οποία  $\sum_j m(E_j) = \infty$  αλλά που οποιεσδήποτε μεταφορές τους δεν καλύπτουν κανένα διάστημα μήκους 1.
- 6 Κατασκευάζουμε ένα τυχαίο γράφημα με  $n$  κορυφές  $G$  ως εξής: για κάθε ζεύγος διαφορετικών κορυφών τοποθετούμε μια ακμή ανάμεσά τους με πιθανότητα  $p$  ανεξάρτητα από τα άλλα ζεύγη κορυφών. (Αυτό συνήθως ονομάζεται Erdős–Rényi τυχαίο γράφημα  $G(n, p)$ .) Έστω  $c(n, p)$  η πιθανότητα ότι η κορυφή 1 συνδέεται με την κορυφή 2 με κάποιο μονοπάτι (όχι απαραίτητα απ' ευθείας με μια ακμή) στο  $G(n, p)$ . Δείξτε ότι για σταθερό  $n$  η  $c(n, p)$  είναι αύξουσα συνάρτηση του  $p$ .  
Υπόδειξη: Δοκιμάστε πρώτα την περίπτωση  $n = 3$ .